

· 医学快讯 ·

来曲唑显著降低激素受体阳性绝经后 乳腺癌患者的死亡和复发风险

《Journal of Clinical Oncology》于2011年2月14日发表了乳腺癌国际研究组BIG 1-98研究的最新结果:与他莫昔芬相比,来曲唑辅助治疗激素受体阳性的绝经后乳腺癌患者,可显著降低死亡、疾病复发和远处转移风险。

BIG 1-98研究共纳入了8010例激素受体阳性绝经后早期乳腺癌患者,其中4922例患者随机接受5年持续来曲唑或他莫昔芬辅助治疗。2005年1月得到初步研究结果后,在接受他莫昔芬治疗的患者中,筛选出619例(25.2%)转换为来曲唑或加强剂量来曲唑辅助治疗。为了减少换药对结果的影响,采用逆概率删失加权分析(IPCW)模型进行分析。中位随访74个月,结果显示:来曲唑治疗组的总生存(OS)风险显著降低18%[风险比(HR)为0.82,95%CI为0.70~0.95];来曲唑和他莫昔芬治疗组的5年OS分别为91.8%和90.4%,无瘤生存(DFS)和远处转移时间(TDR)的HR分别为0.83(95%CI为0.74~0.94)和0.80(95%CI为0.67~0.94)(P 均<0.05)。

(唐鹏 摘编 范林军 审校)

(收稿日期:2011-03-15)

(本文编辑:罗承丽)

唐鹏 摘编. 来曲唑显著降低激素受体阳性绝经后乳腺癌患者的死亡和复发风险[J/CD]. 中华乳腺病杂志:电子版,2011,5(2):261.